


GENÇ YAŞTA GÖRÜLEN KALP HASTALIKLARINA DİKKAT!



thi – Daha çok ileri yaşlarda görülen kalp hastalıkları ve kalp krizi, son yıllarda gençlerde de daha sık ortaya çıkıyor. Doğuştan gelen kalp hastalıklarından tamamen korunmak mümkün olmasa da, ailelerin çocuklarındaki belirtilere dikkat etmeleri, tedavi için geç kalınmaması açısından önem taşıyor. Genetik ve çevresel faktörlere bağlı olan koroner arter hastalığından korunmak için ise, genç yaşlardan itibaren bazı önlemler almak gerekiyor. Memorial Ankara

Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cem Yorgancıoğlu, “Kalp Haftası” öncesinde gençlerde görülen kalp hastalıkları ile tedavi ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Doğuştan gelen kalp hastalıkları genç yaşlara kadar sessizce ilerleyebilir

Gençlerde en sık görülen kalp hastalıkları iki gruba ayrılmaktadır. Birinci grupta; kalbin delik olması, damarların ters çıkması, kapakçık fonksiyon bozuklukları gibi doğuştan gelen anomaliler yer almaktadır. Bu hastalıklar çocuklarda hiç bulgu vermeden genç yaşlara kadar sessizce ilerleyebilir. Gençlerde ortaya çıkan ikinci gruptaki hastalık ise koroner arter hastalığıdır. Bu durum doğuştan gelen hastalıklara oranla çok daha nadir görülmektedir. Koroner arter hastalığı da bazı durumlarda doğuştan geliyor olabilir. Doğuştan gelen koroner arter hastalığında kalbi besleyen koroner damarlar adalelerin arasında yer almaktadır. Kalp kuvvetli kasıldığı zaman damarı kapatabildiği için bu hastalarda ağır egzersizler göğüs ağrısına neden olabilmektedir. Genç sporcularda görülen

ani ölümlerin nedeni çoğu zaman bu duruma bağlı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sporcularda ani ölümlerin diğer bir nedeni de doğuştan aort darlığıdır.

Damarlardaki kolesterol birikimi 25 yaşından itibaren başlıyor

Kalp hastalıklarının ortaya çıkmasındaki başlıca sebeplerden biri, damar sertleşmesine yol açan kolesterol birikimidir. Yapılan bazı araştırmalar bu birikimin 25 yaşından itibaren ince çizgilenmeler şeklinde çok hafif de olsa başladığını göstermektedir. Günümüzde artık 30-35 yaşlarında koroner arter hastalığından stent takılan ya da ameliyat olan hastalar karşımıza çıkmaktadır. Bu yaşlarda hastalar göğüs ağrısı gibi şikayetlerle doktora başvurdıklarında detaylı muayene edilmeli ve aile öyküleri irdelenmelidir. Ailesinde erken yaşlarda koroner arter hastalığı varsa bu hastada da olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Kolesterol mekanizmasındaki bazı bozukluklar genetik olarak aile bireylerine devredilmektedir. Çoğu genç yaştaki hasta bu tür genetik kolesterol metabolizması bozukluklarını taşımaktadır. Kadınlarda hormonlar menopoza dönemine kadar koruyucu bir faktör olsa da bu bozukluğu taşıyan kadın hastalarda da 30-35 yaşlarında koroner arter hastalığı görülebilmektedir.

Çocuklarda kapak hastalıkları dikkat istiyor!

Doğuştan gelen kalp hastalıklarının çocuklardaki en önemli belirtileri; çarpıntı, çabuk yorulma ve yaşıtlarından geri kalmadır. Çocuklardaki kalp kapak hastalıkları kritik değerlere ulaşmadıkları sürece sadece takip edilmektedir. Darlık kritik değerlere ulaşırsa öncelikle kapak açılmaya çalışılmaktadır. Bunun nedeni kapak değişiminin çocukluk çağında kesin çözüm olmamasıdır. Erişkinlik dönemine gelmeden takılan kapak çocuk büyüdüğü zaman küçük kalacağı için bu yaşlarda mevcut kapağı korumak gerekmektedir. Kapak değişiminin zorunlu olduğu durumlarda ise bir takım özel yöntemlerle mümkün olan en büyük kapak takılmaktadır. Darlıkların tedavisinde ilk müdahale çoğu zaman balonla

geniřletmedir. Balonla iyi bir geniřleme saęlanırsa bazı durumlarda hasta tamamen iyileřebilmektedir. Doęuřtan gelen kalp hastalıklarının tedavisinde cerrahi yöntemler hasta erişkin oluncaya kadar genellikle ötelenmektedir.

Sıkıřan damarların tedavisinde cerrahi başarıllı sonu veriyor

Koroner arter tedavisinde ise öncelikle egzersiz testi yaparak kalbi besleyen damarların ciddi bir beslenme bozukluęuna yol aıp aamadıęına bakılmaktadır. Ciddi bir beslenme bozukluęuna neden olan darlık varsa, hastaya ocuk yařta olsa bile anjiyo yapılması gerekmektedir. Anjiyo sonucuna göre ok ciddi sıkıřma varsa zerinden geen adale bandı cerrahi yöntemlerle kesilerek serbest hale getirilmektedir. Eęer ok ciddi bir sıkıřma yoksa egzersiz kısıtlaması ve dzenli kontrollerle hastanın erişkin yařlara gelmesini saęlanmaktadır. Sıkıřan damarlarda nadiren stent de özm olabilse de, oęu zaman cerrahi genlerde daha sık tercih edilmektedir. Bunun sebebi damarın iine konulan stentin de daralmalara yol aabilmesidir.

Akdeniz tipi beslenme ve dzenli fiziksel aktivite önemli

Doęuřtan gelen kalp hastalıklarını önlemek iin yapılabilecek bir řey olmasa da ailelerin ocuklarını bu hastalıkların belirtileri aısından yakından gözlemlemeleri önemlidir. Hastalıęı erken fark etmek; egzersiz dzeyinin kalbi zorlamayacak řekilde ayarlanmasını ve doęru zamanda gecikmeden mdahale edilmesini saęlayacaktır. Koroner arterden korunmak iin ise dikkat edilmesi gereken en önemli nokta beslenme alışkanlıklarıdır. Akdeniz tipi sebze ve beyaz et aęırlıklı beslenme alışkanlıkları ocuęa kazandırılmalıdır. ocuklar ve genler kolesterol oranı yksek olan donmuř ve hazır gıdalardan mmkn olduęunca uzaklařtırılmalıdır. Ayrıca hareketli yařam iin gnde 5000 adım atmak alışkanlık haline getirilmelidir. 5000 adım yaklařık 3 kilometrelik bir mesafeye denk gelmektedir. Genetik mirasımız gnde yaklařık 8 kilometre yrmeye denk gelecek bir egzersizi gerektirmektedir. Bu

nedenle gençler doktor muayenesinden geçtikten sonra uygun bir egzersiz programı uygulamalıdır. Kalp sağlığını korumak için sigardan kesinlikle uzak durulmalı ve alkol tüketimi sınırlandırılmalıdır.